

عنوان:

بررسی ارتباط بین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) و ابتلا به برخی بیماریهای غیر واگیر در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه

هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) و ابتلا به برخی بیماریهای غیر واگیر در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه

اهداف ویژه طرح:

1. تعیین ارتباط بین ابتلا به بیماری فشار خون بالا و شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
2. تعیین ارتباط بین مدت ابتلا به بیماری فشار خون بالا و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
3. تعیین ارتباط بین مصرف داروهای بیماری فشار خون بالا و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
4. تعیین ارتباط بین ابتلا به بیماری دیابت و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
5. تعیین ارتباط بین مدت ابتلا به بیماری دیابت و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
6. تعیین ارتباط بین مصرف داروهای بیماری دیابت و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
7. تعیین ارتباط بین ابتلا به سندروم متابولیک و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
8. تعیین ارتباط بین ابتلا به چاقی و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
9. تعیین ارتباط بین ابتلا به بیماری سکته قلبی و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
10. تعیین ارتباط بین مدت ابتلا به بیماری سکته قلبی و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه
11. تعیین ارتباط بین تری گلیسیرید بالا و میانگین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) در بالغین 70-35 سال کهورت هویزه

اهداف کاربردی:

با استفاده از نتیجه مطالعه در کنترل پوسیدگی در این بیماران اقدام شود.

خلاصه روش کار:

مطالعه حاضر از نوع مطالعه مقطعی تحلیلی است. افراد مورد مطالعه ، شرکت کنندگان در مطالعه بالغین کهورت هویزه هستند. معیارهای ورود به مطالعه سن 35 تا 70 سال و تمایل افراد به شرکت در مطالعه خواهد بود . برای کاهش تاثیر عوامل مخدوشگر، افراد با بیماری های زمینه ای (بجز بیماری های دیابت، فشار خون بالا ، TG و کلسترول بالا، سندرم متابولیک، سابقه سکته قلبی و مغزی و چاقی) ، افراد سیگاری با سابقه سیگار کشیدن بیش از 10 سال در گذشته ، الکلی کنونی و افرادی با بهداشت دهانی بسیار پایین (عدم استفاده از مسواک) از مطالعه حذف خواهند شد. معاینه توسط تکنسین آموزش دیده انجام می گردد.

دراین پژوهش درمرحله اول میانگین شاخص DMFT به عنوان متغیرمستقل و بیماری های دیابت، فشاری خون بالا ، TG و کلسترول بالا، سندرم متابولیک، سابقه سکته قلبی و مغزی و چاقی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته خواهند شد. بعد از همسان سازی از نظر سن و جنس ،ارتباط بین شاخص پوسیدگی دندان (DMFT) با ابتلا به بیماری های سیستمیک، طول مدت ابتلا بیماریها، همچنین مصرف داروهای درمان کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت .